## 帯状疱疹ワクチン <u>シングリックスのご予</u>約について

- ・帯状疱疹は、多くの人が子供のときに感染する水ぼうそうのウイルスが原因で起こります。水ぼうそうが治った後も、ウイルスは体内(神経節)に潜伏していて、過労やストレスなどで免疫力が低下すると、ウイルスが再び活性化して、帯状疱疹を発症します。
- ・体の左右どちらかの神経に沿って、痛みを伴う赤い斑点と水ぶくれが多数集まって帯状に生じます。発症すると、皮膚の症状だけでなく、神経にも炎症を起こし、痛みがあらわれます。神経の損傷がひどいと、皮膚の症状が治った後も、痛みが続くことがあります。
- ・50歳以上で帯状疱疹を発症した人のうち、約2割は3か月以上痛みが続く帯状疱疹後神経痛になるといわれています。
- ・帯状疱疹ウイルスは90%以上の日本人に潜伏しています。いつ、体のどの部分に発症するかは分かりません。基礎疾患のある方は特に発症リスクが増大します。

【ワクチンの種類】 不活化ワクチン

【接種方法・回数】 筋肉注射 接種回数2回

【標準的な接種スケジュール】初回接種から2ヵ月間の間隔をおいて2回目を接種する

接種間隔

1回目初回



2回目 2ヵ月後

【予防効果】 97.2% ※どの年齢も同程度の効果で帯状疱疹後神経痛 85.5%減少

【持続期間】 7年 ※新薬なのでデータは現在ここまで

【副反応】接種部位の痛み 78.0% 倦怠感 32.9%など

【特徴】・予防効果が高い ・副反応が比較的多い、しかしその多くは 3 日程度で軽快

- ・2回接種が必要 ・値段が高い ・免疫が低下している方にも接種できる
- ・接種時の痛みが高度

【対象年齢】50歳以上

【料金(税込)】 1回22,000円 2回接種で44,000円

<u>ご予約は相澤健康センターまで</u> 0263-34-6360